

ESTUDIO MONOGRÁFICO DE LOS TUMORES DE LOCALIZACIÓN C50 – MAMA

Se registraron 402 casos nuevos en 2000, siendo el tumor más frecuente en la mujer. Y representando el 12,7 % de los tumores registrados en este año. El H12O atendió íntegramente 224 casos (55,7 %) y en el resto el hospital actuó como apoyo.


CLASE DE CASO. MAMA

	Frecuencia	Porcentaje
Caso Consulta AP	6	1,5
Tto. de Apoyo en Hosp.	167	41,5
Diag. y Tto. Primarios en Hosp.	224	55,7
Caso A11 Diag.y/o Tto. Centro Concertado	5	1,2
Total	402	100

La media de **edad** es $56 \pm 13,2$ años con una mediana de 55 y una moda de 54 años. En cuanto a **sexo**, se registraron sólo 4 casos en varones (1 %). Por grupos de edad se observa que empieza a aparecer en edades jóvenes, suponiendo, entre los 45 y 59 años, el 52 % de los casos.


HISTOGRAMA DE EDAD

MAMA



DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

MAMA



* Los casos de varones aparecen en la franja de edad de 40 a 54 años

La **base del diagnóstico** fue citohistológica en el 99,7 % de los casos.

MÉTODO DIAGNÓSTICO. MAMA

	Frecuencia	Porcentaje
Investigación clínica	1	0,2
Citología de primario	5	1,2
Histología de metástasis	2	0,5
Histología de primario	394	98,0
Total	402	100

En cuanto a los **tipos histológicos** el 93,8 % son carcinomas ductales, lobulillares y medulares.

TIPOS HISTOLÓGICOS. MAMA


	Frecuencia	Porcentaje
Carcinomas ductales, lobulillares y medulares	377	93,8
Neoplasias quísticas, mucinosas y serosas	10	2,5
Carcinomas SAI	9	2,2
Linfomas no Hodgkin	2	0,5
Neoplasias SAI	2	0,5
Adenocarcinomas	1	0,2
Sarcomas excepto óseos y Kaposi	1	0,2
Total	402	100

Al diagnóstico la **extensión tumoral** es en la mayoría localizada (54,1 %) pero en el 34,6 % hay ya metástasis ganglionares.

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LRD LRD. MAMA.

	Frecuencia	Porcentaje
In situ	33	8,5
Localizado	211	54,1
Regional	135	34,6
Diseminado	11	2,8
Total constan	390	100
No consta, no procede	12	2,8

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LRD. MAMA



La distribución de estos tumores según los **grados de Bloom** que se han recogido de los informes histopatológicos en la serie de casos íntegramente atendidos por el H12O (clase 4) muestra el grado II como el más frecuente (42,1 %).

ESTADIFICACIÓN ESPECÍFICA MAMA. (Grados de Bloom)
Pacientes diagnosticados y tratados en el H12O

	Frecuencia	Porcentaje *
Grado I	32	22,9
Grado II	59	42,1
Grado III	49	35,0
Total constan	140	100
No constan	84	37,5

* Porcentajes en relación a los que consta estadificación.

En los 224 tumores atendidos íntegramente en el H12O (clase 4), constan 470 tratamientos oncológicos. El 93,8 % de los pacientes se tratan con cirugía.

TOTAL TIPO DE TRATAMIENTO. MAMA. PACIENTES DIAGNOSTICADOS Y TRATADOS EN EL H12O.

	Frecuencia	Porcentaje respecto al total Casos (224)	Porcentaje respecto al total Ttos.(470)
Cirugía	210	93,8	44,7
Radioterapia	118	52,7	25,1
Quimioterapia	106	47,3	22,6
Hormonoterapia	36	16,1	7,7
No consta, no procede	6	2,7	1,3